herpy

AGAMY

Agama wodna

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus to duża, zielona, półwodna agama z zalesionych cieków wodnych Azji Południowo-Wschodniej. Osiąga do ok. 90 cm długości, z czego ponad dwie trzecie przypada na ogon. Gatunek jest aktywny w dzień, wspina się i nurkuje, a do utrzymania wymaga bardzo dużego, wysokiego i wilgotnego terrarium z głęboką częścią wodną, silnym UVB i ciepłym miejscem do wygrzewania. Znaczna część zwierząt w handlu pochodzi z odłowu.

Rodzina: Agamidae Nazwa angielska: Chinese Water Dragon Dawna nazwa: *Dilophyrus mentager*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**70-90 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**250-600 g**
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i półwodny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**180 × 90 × 180 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-40 °C**
Temperatura w nocy	**21-24 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Część wodna** głębokość 15-30 cm
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, rośliny i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-18 jaj**
Inkubacja	**60-75 dni** przy 29-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Pojedyncze dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 180 × 90 × 180 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA

Miejsce do wygrzewania powinno mieć 35-40 °C, mierzone cyfrowym termometrem bezpośrednio na gałęzi. Młode potrzebują miejsca do wygrzewania w dolnej części tego zakresu.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 %, najwyższa rano (ok. 75-80 %) i niższa wieczorem (ok. 50-60 %). Osiąga się to 1-2 zraszaniami dziennie lub automatycznym systemem zraszającym, wilgotnym podłożem i dużą częścią wodną.

WODA I JAKOŚĆ WODY

Część wodna musi być na tyle duża, żeby zwierzę mogło nurkować i pływać: co najmniej 15 cm głębokości, najlepiej więcej, i powinna zajmować od jednej trzeciej do połowy powierzchni dna.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje silnego UVB odpowiadającego strefie Fergusona 3. Używaj świetlówki T5 HO 10-12 % UVB w oprawie z odbłyśnikiem, po tej samej stronie co lampy grzewcze.

ŻYWIENIE

Physignathus cocincinus jest wszystkożerna, ale żywi się głównie owadami. Młode zwierzęta jedzą prawie wyłącznie owady, a z wiekiem w diecie pojawia się więcej roślin. Młode poniżej 3 miesięcy: małe świerszcze codziennie.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Physignathus cocincinus jest płochliwa i wrażliwa na stres, zwłaszcza zwierzęta z odłowu. Pozwól nowemu zwierzęciu się zaaklimatyzować bez brania na ręce, a potem zacznij podawać pokarm pęsetą, żeby samo do ciebie podchodziło.

NATURALNY ZASIĘG

Chiny, Wietnam, Laos, Kambodża i Tajlandia.