herpy

AGAMY

agama brodata

Pogona barbata

Pogona barbata to jedna z największych agam brodatych: masywna, dzienna agama o długości 50-65 cm, pochodząca ze wschodnioaustralijskich lasów i zarośli, z dobrze rozwiniętą, ciemną brodą i żółtym wnętrzem pyska. Jest bardziej terytorialna niż *Pogona vitticeps*, chętnie się wspina i wymaga dużego terrarium, silnego grzania oraz UVB.

Rodzina: Agamidae Nazwa angielska: Eastern Bearded Dragon Dawna nazwa: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**50-65 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny, naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-37 °C**
Miejsce wygrzewania	**42-45 °C**
Temperatura w nocy	**12-24 °C**
Wilgotność	**30-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**15-35 jaj**
Zniesienia w roku	**2-3**
Inkubacja	**55-75 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla samej *P. barbata* jest opisana tylko skąpo.
TEMPERATURA	Grzej co najmniej dwoma spotami halogenowymi nad miejscem do wygrzewania.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić średnio 30-60 %, mierzona po chłodnej stronie. Naturalnie się waha: jest niższa przy miejscu do wygrzewania, wyższa nocą i przy wodzie.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pogona barbata* potrzebuje silnego, białego światła, które pobudza apetyt i aktywność. Terrarium musi być bardzo jasne, a miejsce do wygrzewania powinno być najjaśniejszym punktem.
ŻYWIENIE	*P. barbata* jest wszystkożerna. W naturze pożywienie stanowią owady, dżdżownice, małe kręgowce i części roślin. Młode jedzą głównie owady, a dorosłe głównie rośliny.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pogona barbata* jest terytorialna i okazuje to wyraźniej niż *Pogona vitticeps*. Czarna, nastroszona broda, otwarty pysk z żółtym wnętrzem, syczenie i krótki skok w stronę przeciwnika to groźby.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/agamy/pogona-barbata