herpy

AGAMY

Black-soil Bearded Dragon

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni to najmniejsza z agam brodatych: niska, krępa agama osiągająca najwyżej ok. 30 cm, pochodząca z bezdrzewnych równin czarnych gleb gliniastych w środkowym Queenslandzie, ze słabo zaznaczoną brodą i krótką, tępo zakończoną głową. Jest aktywna w dzień, spokojna i zadowala się znacznie mniejszą przestrzenią niż *Pogona vitticeps*, ale ma takie same potrzeby w zakresie ciepła, silnego UVB i podłoża, w którym można kopać. Żyje 10-15 lat.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Pogona brevis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-45 °C**
Temperatura w nocy	**13-24 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**5-19 jaj**
Zniesienia w roku	**2**
Inkubacja	**58-64 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedynczy dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 45 × 45 cm, a dodatkowa przestrzeń zostanie wykorzystana. Mała grupa, np. samiec z jedną lub kilkoma samicami, wymaga co najmniej 120 × 60 × 60 cm.
TEMPERATURA	Miejsce do wygrzewania powinno mieć temperaturę powierzchni 38-45 °C, mierzoną termometrem na podczerwień na kamieniu. Chłodny koniec powinien mieć 24-29 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić średnio 30-50 %, mierzona na środku terrarium cyfrowym higrometrem. Krótkie wahania w górę lub w dół są niegroźne.
OŚWIETLENIE I UVB	*P. henrylawsoni* jest aktywna w dzień i potrzebuje dużo jasnego, białego światła oraz silnego UVB. Użyj świetlówki T5 HO 10-12 % UVB w odbijającej oprawie po tej samej stronie co lampa grzewcza.
ŻYWIENIE	*P. henrylawsoni* jest wszystkożerna i zjada głównie owady oraz zielone liście. Świeżo wyklute (poniżej 3 miesięcy): owady 2-3 razy dziennie i zielenina codziennie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*P. henrylawsoni* jest spokojna i znosi ostrożne branie na rękę, ale nie lubi być przytrzymywana ani obracana na plecy i wierzga, gdy to się dzieje.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.