herpy

AGAMY

Abrolhos Bearded Dragon

Pogona minima

Pogona minima to mała, dzienna agama brodata, występująca wyłącznie na wyspach Wallabi w archipelagu Houtman Abrolhos u wybrzeży Australii Zachodniej. Mierzy około 11 cm od pyska do kloaki, ma długie kończyny i ogon oraz jedynie słabo zaznaczoną brodę. Doświadczeń hodowlanych prawie brak, dlatego poradnik opiera się na najbliższych krewnych.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Amphibolurus barbatus minimus; Amphibolurus minimus; Pogona minor minima*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-37 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**13-24 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-19 jaj**
Inkubacja	**58-64 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Pogona minima* wiadomo niewiele, a gatunek prawie nie został opisany w niewoli.
TEMPERATURA	Ogrzewaj co najmniej dwoma spotami halogenowymi nad miejscem do wygrzewania. Powierzchnia w tym miejscu powinna mieć 40-45 °C w pomiarze termometrem na podczerwień, a ciepła plama musi być co najmniej tak duża jak całe zwierzę.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 30-50 %, mierzona w chłodnym końcu, a terrarium musi mieć możliwość przeschnięcia. Stojące, wilgotne powietrze i mokre podłoże prowadzą do chorób.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pogona minima* jest aktywna w dzień i potrzebuje silnego, białego światła. Miejsce do wygrzewania powinno być najjaśniejszym punktem, a oświetlone powinno być 75-100 % długości terrarium.
ŻYWIENIE	*Pogona minima* karmisz tak jak *Pogona minor*: głównie owadami i w mniejszej części zieleniną. Świeżo wyklute (poniżej 3 miesięcy): owady 2-3 razy dziennie i zielenina codziennie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pogona minima* jest aktywna w dzień i dużo się wygrzewa. Mowa ciała jest znana z innych agam brodatych: kiwanie głową wobec rywali i machanie przednią łapą na znak uległości.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.