herpy

AGAMY

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor to średniej wielkości, stosunkowo smukła i aktywna za dnia agama brodata o długości 30-40 cm z południowo-zachodniej i środkowej Australii, z jedynie słabo zaznaczoną brodą z drobnych kolców. Żyje na wydmach, w zaroślach i suchych lasach, żywi się głównie owadami i składa kilka niewielkich zniesień w roku.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Amphibolurus minor; Pogona loriae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-40 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-37 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**13-24 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-19 jaj**
Zniesienia w roku	**2-4**
Inkubacja	**58-64 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla *P. minor* jest opisana tylko w niewielkim stopniu. Wartości dotyczące terrarium, temperatury, wilgotności, oświetlenia, pokarmu i długości życia zostały zapożyczone od *Pogona vitticeps* i mniejszej *Pogona henrylawsoni*.
TEMPERATURA	Ogrzewaj za pomocą co najmniej dwóch spotów halogenowych nad miejscem do wygrzewania.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 30-50 %, mierzona w chłodnym końcu, a terrarium musi mieć możliwość wyschnięcia, ponieważ gatunek żyje w suchych regionach. Zastałe, wilgotne powietrze i mokre podłoże prowadzą do chorób.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pogona minor* potrzebuje silnego, białego światła, które pobudza apetyt i aktywność. Miejsce do wygrzewania powinno być najjaśniejszym punktem, a oświetlone powinno być 75-100 % długości terrarium.
ŻYWIENIE	*Pogona minor* jest głównie owadożerna.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pogona minor* jest aktywna za dnia i dużo się wygrzewa. Zwierzę posługuje się mową ciała jak inne agamy brodate: samce kiwają głową w stronę rywali, a machanie przednią kończyną jest oznaką uległości.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.