herpy

AGAMY

North-west Bearded Dragon

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli to smukła, dzienna agama brodata o długości około 40 cm z tropikalnej północno-zachodniej Australii, o słabo wykształconej brodzie i mocniejszych kolcach na karku niż u *Pogona minor*. Hodowla wygląda tak samo jak u najbliższych krewnych: ciepło, mocne UVB, podłoże do kopania i głównie owady.

Rodzina: Agamidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-40 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-37 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**30-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-19 jaj**
Zniesienia w roku	**2-4**
Inkubacja	**58-64 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Pogona mitchelli* jest skąpa. Klimat w obszarze występowania jest ciepły przez cały rok, z krótką porą deszczową i długim, suchym okresem z chłodnymi nocami.
TEMPERATURA	Ogrzewaj co najmniej dwoma spotami halogenowymi nad miejscem do wygrzewania. Powierzchnia w tym miejscu powinna mieć 40-45 °C, mierzone termometrem na podczerwień, a ciepła plama musi być co najmniej tak duża jak całe zwierzę.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 30-60 %, mierzona w chłodnej części, a terrarium musi zdążyć wyschnąć między zraszaniami.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pogona mitchelli* jest aktywna w dzień i potrzebuje bardzo jasnego, białego światła oraz mocnego UVB. Użyj świetlówki T5 HO 10-14 % UVB w oprawie z odbłyśnikiem nad ciepłą stroną, równolegle do lamp grzewczych.
ŻYWIENIE	*Pogona mitchelli* karmi się głównie owadami i niewielką ilością zieleniny: Świeżo wyklute (poniżej 3 miesięcy): owady 2-3 razy dziennie i zielenina codziennie. Młode (3-12 miesięcy): owady i zielenina codziennie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pogona mitchelli* jest aktywna w dzień i dużo się wygrzewa. Jak inne agamy brodate posługuje się mową ciała: samce kiwają głową wobec rywali i samic, a machanie przednią łapą jest oznaką uległości. Prezentacja brody jest słaba.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.