herpy

AGAMY

Nullabor Bearded Dragon

Pogona nullarbor

Pogona nullarbor to średniej wielkości agama brodata o długości około 30-35 cm, z krótkim pyskiem i krótkim ogonem, znana wyłącznie z równiny Nullarbor w południowej Australii. Ma ubarwienie od czerwonobrązowego do pomarańczowobrązowego z jasnymi poprzecznymi pasami i kilkoma rzędami dużych kolców wzdłuż boków, a w terrarium utrzymywana jest bardzo rzadko.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Amphibolurus nullarbor*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-35 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-37 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**13-24 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**6-12 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**14-20 jaj**
Inkubacja	**75-85 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Pogona nullarbor* jest niewielka, ponieważ gatunek prawie nie jest utrzymywany poza Australią.
TEMPERATURA	Ogrzewaj co najmniej dwoma spotami halogenowymi nad miejscem do wygrzewania. Powierzchnia w tym miejscu powinna mieć 40-45 °C w pomiarze termometrem na podczerwień, a ciepła plama musi być co najmniej tak duża jak całe zwierzę.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 30-50 %, mierzona w chłodnej części, a terrarium musi mieć możliwość przeschnięcia, ponieważ gatunek żyje na suchym obszarze. Zastałe, wilgotne powietrze i mokre podłoże prowadzą do chorób.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pogona nullarbor* potrzebuje silnego, białego światła, które pobudza apetyt i aktywność. Miejsce do wygrzewania powinno być najjaśniejszym punktem, a oświetlone powinno być 75-100 % długości terrarium.
ŻYWIENIE	*Pogona nullarbor* karmi się tak jak inne średniej wielkości agamy brodate: głównie owadami, z codziennym dodatkiem zieleniny.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pogona nullarbor* prowadzi dzienny tryb życia i dużo się wygrzewa.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.