herpy

AGAMY

Egyptian Spiny-tailed Lizard

Uromastyx aegyptia

Uromastyx aegyptia to największy kolcogon: ciężka, roślinożerna jaszczurka pustynna z Egiptu, Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego, która może osiągać do 76 cm długości i 2,5 kg masy. Kopie głębokie nory, wygrzewa się w silnym upale i wymaga bardzo dużego, suchego terrarium z mocnym UVB. Gatunek jest narażony na wyginięcie w naturze i nadaje się wyłącznie dla doświadczonego opiekuna z dużą ilością miejsca.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Stellio spinipes; Uromastyx leptieni; Uromastyx microlepis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**40-76 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**1 000-2 500 g**
Długość życia	**15-30 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia i półpustynia**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**240 × 120 × 120 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**50-55 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**20-30%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Zimowanie	**16-22 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**6-23 jaj**
Inkubacja	**56-84 dni** przy 33-34 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM
Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 240 × 120 × 120 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA
Miejsce wygrzewania powinno mieć temperaturę powierzchni 50-55 °C, mierzoną termometrem na podczerwień tuż pod lampą. Chłodna strona ma 27-32 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA
Wilgotność powietrza powinna być niska, około 20-30 %, mierzona przy podłożu po chłodnej stronie. Stale wysoka wilgotność powoduje choroby, więc nie zraszaj terrarium.

OŚWIETLENIE I UVB
Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje mocnego światła. Użyj dużej lampy LED lub kilku świetlówek o barwie około 6500 K jako światła dziennego, oddzielonych od źródła ciepła; zwierzęta są wtedy aktywniejsze i lepiej jedzą.

ŻYWIENIE
Uromastyx aegyptia jest roślinożerna. Około 90 % pokarmu powinny stanowić zielone liście i kwiaty, ok. 5 % twarde warzywa i ok. 5 % pokarm suchy.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM
Dorosłe zwierzęta są spokojne i osiadłe, ale terytorialne wobec osobników własnego gatunku, zwłaszcza samce wobec samców. Trzymaj je pojedynczo.

NATURALNY ZASIĘG
Egipt, Izrael, Jordania, Syria, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Jemen.