herpy

AGAMY

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata to niewielki, krępy kolczastoogon ze skalistych pustyń wokół południowej części Morza Czerwonego. Grzbiet zdobią jasne plamki przypominające oczka, a samiec jest bardziej kolorowy niż samica. Gatunek osiąga 25-30 cm, żywi się roślinami i zakopuje się w głębokim, suchym podłożu. Wymaga ciepłego, suchego terrarium z silnym UVB i łatwo go pomylić z najbliższymi krewnymi.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny, naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia, półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**50-55 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**20-30%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-60 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**4-20 jaj**
Inkubacja	**60-70 dni** przy 33-34 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze.
TEMPERATURA	Miejsce do wygrzewania powinno mieć temperaturę powierzchni 50-55 °C, mierzoną termometrem na podczerwień tuż pod lampą. Chłodna strona ma 27-32 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza musi być niska, około 20-30 %, mierzona przy podłożu po chłodnej stronie. Stale wysoka wilgotność wywołuje choroby, więc nie zraszaj terrarium.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje silnego światła. Jako światło dzienne stosuj lampę LED lub świetlówkę o barwie ok. 6500 K, oddzielnie od ogrzewania; zwierzęta są przy nim bardziej aktywne i lepiej jedzą.
ŻYWIENIE	*Uromastyx ocellata* jest roślinożerna. Około 90 % pokarmu powinny stanowić zielone liście i kwiaty, ok. 5 % twarde warzywa i ok. 5 % suchy pokarm.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe osobniki są spokojne i osiadłe, ale terytorialne wobec innych przedstawicieli gatunku, zwłaszcza samce wobec samców. Trzymaj je pojedynczo.
NATURALNY ZASIĘG	Egipt, Sudan, Erytrea, Dżibuti, Etiopia i Somalia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/agamy/uromastyx-ocellata