herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana to mały, beznogi płaz beznogi, występujący wyłącznie w górach Taita w południowo-wschodniej Kenii. Samica składa nieliczne jaja w komorze w ziemi i pozostaje przy nich, a świeżo wyklute młode żywią się jej zewnętrzną warstwą skóry. Gatunek jest zagrożony, a jego utrzymanie w niewoli jest niemal nieznane.

Rodzina: Herpelidae Dawna nazwa: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**24-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Kopiący nory**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-24 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**90-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Rozwój bezpośredni (bez kijanek)**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**5**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Boulengerula taitana* jest bardzo skąpa. Klimat gór Taita jest tropikalny, ale łagodny ze względu na wysokość, z dwiema porami deszczowymi, a gatunek żyje w wilgotnej, luźnej ziemi.
TEMPERATURA	Temperatury gleby dla tego gatunku nie zmierzono. 21-24 °C w dzień i 19-22 °C w nocy to szacunek odpowiedni dla lądowych płazów beznogich i łagodnego klimatu górskiego.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Podłoże musi być równomiernie wilgotne, a powietrze w pojemniku jest niemal nasycone, 90-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek nie potrzebuje miski z wodą ani części wodnej. Kondensat na ściankach pojemnika wystarcza do picia, a woda służy jedynie do utrzymywania wilgotności podłoża.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje pod ziemią i nie potrzebuje UVB ani innego oświetlenia. Wystarczy zwykły rytm dobowy pomieszczenia z 10-14 godzinami światła. Pojemnik utrzymuje się w ciemności i nie może stać w bezpośrednim słońcu.
ŻYWIENIE	W naturze *Boulengerula taitana* zjada głównie termity i dżdżownice; młode jedzą przeważnie dżdżownice. W niewoli najbardziej realistycznym pokarmem podstawowym są małe dżdżownice.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Boulengerula taitana* prowadzi skryty, podziemny tryb życia, a zdrowe zwierzę przez większość czasu pozostaje zakopane. Gatunek trzyma się pojedynczo, co ułatwia kontrolę masy ciała i zdrowia.
NATURALNY ZASIĘG	Kenia.