herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma to masywny, ryjący płaz beznogi z lasów deszczowych, plantacji i ogrodów Afryki Środkowej, osiągający około 46 cm długości. Składa jaja w ziemi, a samica leży zwinięta wokół jaj i młodych, które żywią się jej zewnętrzną warstwą skóry. W niewoli gatunek okazał się odporny w porównaniu z innymi płazami beznogimi.

Rodzina: Herpelidae Dawna nazwa: *Caecilia squalostoma*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**24-46 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-25 °C**
Temperatura w nocy	**21-23 °C**
Wilgotność	**90-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Rozwój bezpośredni (bez kijanek)**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**16**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*H. squalostoma* jest utrzymywany w niewielkiej liczbie, a zasady hodowli opierają się na doświadczeniach z samym gatunkiem i z innymi lądowymi płazami beznogimi.
TEMPERATURA	Gatunek utrzymuje się w stabilnej, ciepłej temperaturze: 22-25 °C w dzień i 21-23 °C w nocy. Średnia temperatura gleby wpływa na to, ile zwierzęta jedzą, dlatego powinna być stała.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Powietrze w pojemniku jest niemal nasycone, 90-100 %, ponieważ gleba jest wilgotna. Wilgotność utrzymuje się przez zraszanie podłoża i od czasu do czasu przekopywanie górnych centymetrów.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek nie potrzebuje miski z wodą ani części wodnej. Wilgoć pochodzi z gleby, a skropliny na ściankach pojemnika wystarczą do picia. Miska z wodą może nadmiernie zawilgocić podłoże.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje pod ziemią i nie potrzebuje określonego programu oświetlenia. Wystarczy zwykły rytm dobowy pomieszczenia z 10-14 godzinami światła.
ŻYWIENIE	Dżdżownice to sprawdzony pokarm podstawowy: młode osobniki mogą wyrosnąć na duże, masywne dorosłe zwierzęta, jedząc wyłącznie dżdżownice, jeśli robaki są wcześniej wzbogacane wapniem i witaminami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*H. squalostoma* spędza niemal całe życie pod ziemią i rzadko pojawia się na powierzchni.
NATURALNY ZASIĘG	Nigeria, Kamerun, Gwinea Równikowa, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Konga i Republika Środkowoafrykańska.