herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense to beznoga, ryjąca płaziniec, który żyje wyłącznie na Wyspie Świętego Tomasza i na małej sąsiedniej wysepce Ilhéu das Rolas w Zatoce Gwinejskiej. Często jest jaskrawożółty, rodzi żywe, w pełni rozwinięte młode i należy do nielicznych płazów beznogich rozmnożonych w niewoli. Hodowla sprowadza się do głębokiej, wilgotnej ziemi bez nawozów i środków ochrony roślin.

Rodzina: Dermophiidae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-34 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia i w nocy**
Tryb życia	**Kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-24 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**85-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Rozwój	**Żyworodność**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Wielkość miotu	**1-16 młodych**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Gatunek jest lądowy i ryjący, więc w hodowli najważniejsza jest ziemia. Trzyma się go i rozmnaża w niewielkiej liczbie, a zalecenia opierają się na samym gatunku i na innych lądowych płazach beznogich.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień wynosi 21-24 °C, a w nocy 20-22 °C, co odpowiada ziemi w górskich lasach, w których żyje gatunek. W pomieszczeniu o stabilnej temperaturze ogrzewanie zwykle nie jest potrzebne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza w pojemniku wynosi 85-100 %, ponieważ ziemia jest wilgotna. Wilgotność utrzymuje się, zraszając ziemię i od czasu do czasu przekopując kilka górnych centymetrów.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek nie potrzebuje miski z wodą ani części wodnej. Wilgoć pochodzi z ziemi, a kondensat na ściankach pojemnika wystarcza do picia. Pływa bardzo niezdarnie, a głęboka woda grozi utonięciem.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy, i na początku często pokazuje się na powierzchni; po kilku tygodniach aklimatyzacji widać go rzadziej.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są dżdżownice, przyjmowane są też larwy barciaka. Dorosły osobnik dostaje 10-15 małych dżdżownic co dwa tygodnie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*S. thomense* kopie rozległe systemy korytarzy. W naturze kilka osobników leży razem w tym samym pniaku. Gatunek potrafi wystawić głowę z ziemi i pozostać tak do 20 minut, nie reagując na ruch w pobliżu.
NATURALNY ZASIĘG	Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.