herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Rubber Eel

Typhlonectes natans

Typhlonectes natans to całkowicie wodny, beznogi płaz z Kolumbii i Wenezueli o długim, gładkim, ciemnym niebieskoszarym ciele, małych oczach ukrytych pod skórą i niskiej płetwie grzbietowej. Gatunek rodzi żywe młode i trzymany jest w ciepłym, miękkim, dobrze filtrowanym akwarium z ciężką, szczelnie przylegającą pokrywą.

Rodzina: Typhlonectidae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-73 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**40-250 g**
Długość życia	**10-14 lat**
Aktywność	**Za dnia, o zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Sawanna i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 45 × 50 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-30 °C**
Temperatura w nocy	**24-30 °C**
Wilgotność	**100%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 30-40 cm
Temperatura wody	**24-30 °C**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, gotowa karma, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Rozwój	**Żyworodność**
Dojrzałość płciowa	**48 miesięcy**
Wielkość miotu	**1-11 młodych**
Ciąża	**210-300 dni**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Typhlonectes natans trzyma się w akwarium. Trzy dorosłe osobniki potrzebują co najmniej 120 × 45 × 50 cm (około 250 litrów) z dużym filtrem zewnętrznym. Im większa objętość wody, tym stabilniejsza jej jakość.

TEMPERATURA

Temperatura wody powinna wynosić 24-30 °C. Naturalne sezonowe wahania w tym zakresie naśladują rzeki z obszaru występowania i mogą sprzyjać rozmnażaniu. Około 32 °C powoduje stres cieplny.

WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE

Wilgotność powietrza nie ma znaczenia, bo zwierzę żyje w wodzie. Powietrze pod szczelną pokrywą jest nasycone wilgocią, dlatego w tabeli podano 100 %. Liczy się jakość wody; zobacz rozdział o wodzie.

WODA I JAKOŚĆ WODY

Płazy beznogie wchłaniają substancje przez skórę, więc jakość wody jest kluczowa. Filtr musi być dojrzały, zanim wpuścisz zwierzęta.

OŚWIETLENIE I UVB

Wystarczy zwykłe oświetlenie akwariowe przez 12 godzin na dobę. Zwierzęta wolą ciemność, więc zawsze muszą mieć ciemne kryjówki.

ŻYWIENIE

Typhlonectes natans zjada niemal każdy pokarm mięsny: dżdżownice, świerszcze, larwy chrząszczy, krewetki i inne skorupiaki, małże, larwy komarów, rozmrożone ryby, noworodki myszy i gotowy pokarm dla płazów.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest spokojny, nieterytorialny i najlepiej czuje się w grupie, w której zwierzęta dzielą kryjówki.

NATURALNY ZASIĘG

Kolumbia i Wenezuela.