herpy

DRZEWOŁAZY

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus to niewielki, lśniąco czarny drzewołaz z białymi lub żółtawymi plamkami oraz jaskrawopomarańczowymi plamami przy przednich łapach i kolanach. Żyje na dnie lasu w stanie Pará w brazylijskiej Amazonii, a jego nazwa nawiązuje do orzecha brazylijskiego, którego puste łupiny samiec wykorzystuje jako zbiorniki wodne dla kijanek. O jego utrzymaniu wiadomo niewiele.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates castaneoticus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-23 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**5-7 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-8**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O utrzymaniu *Adelphobates castaneoticus* wiadomo niewiele. Gatunek żyje w warstwie liści na dnie lasu, w ciepłym i wilgotnym klimacie nizinnym.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 24-27 °C, a w nocy spadać o 3-4 °C, do 20-24 °C. Wahania w ciągu roku powinny być niewielkie, 1-2 °C. Odpowiada to klimatowi nizin w stanie Pará.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić około 70-80 % w środku dnia i blisko 100 % rano i wieczorem, a warstwa liści i podłoże muszą być stale wilgotne.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Miska z wodą nie jest konieczna, chyba że chce się uzyskać potomstwo. Żaby czerpią wilgoć ze zraszania i wilgotnych liści.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij 10-12 godzin światła dziennie z użyciem świetlówek lub LED dla roślin. W naturze gatunek żyje w cieniu pod koronami drzew, więc światło ma dostarczać roślinom dość energii do wzrostu, bez nadmiernego nagrzewania terrarium.
ŻYWIENIE	*A. castaneoticus* żywi się w naturze mrówkami, termitami i innymi drobnymi stawonogami. W niewoli karm skoczogonkami, małymi wywilżnami i małymi równonogami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*A. castaneoticus* jest aktywny za dnia i żyje głównie na dnie lasu.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/adelphobates-castaneoticus