herpy

DRZEWOŁAZY

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis to mała, ciemna żaba o długości 3-4 cm z Amazonii i Wyżyny Gujańskiej, z pomarańczowożółtą plamą za przednią kończyną i półksiężycowatą pomarańczową plamą na udzie. Jest aktywna w dzień i żyje na ziemi, samce bronią terytoriów donośnym nawoływaniem, a zaloty należą do najdłuższych wśród drzewołazów. Gatunek należy do rodziny Aromobatidae i uchodzi za nietoksyczny.

Rodzina: Aromobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Temperatura w nocy	**21-24 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**8-20**
Czas do wyklucia	**15-20 dni**
Okres larwalny	**40-50 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Głony i rośliny**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *Allobates femoralis* potrzebuje szklanego terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 40 × 40 cm. Gatunek żyje przy ziemi, więc najważniejsza jest powierzchnia dna, choć samce chętnie wspinają się nieco wyżej, by nawoływać.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 25-28 °C, a w nocy 21-24 °C, czyli 3-4 stopnie mniej. Dobowe wahania odpowiadają warunkom w Gujanie Francuskiej i sprzyjają rozrodowi.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza musi być wysoka: 70-80 % w środku dnia i blisko 100 % rano i wieczorem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij niską szklaną miseczkę o średnicy około 10 cm z 1-2 cm wody, z której żaby łatwo wyjdą. Korzysta z niej też samiec, gdy musi pozostawić kijanki.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest przede wszystkim dla roślin. Zapewnij 12 godzin światła dziennie, na przykład od 7 do 19. Świetlówki lub LED o temperaturze barwowej około 6500 K dają naturalne kolory i dobry wzrost roślin.
ŻYWIENIE	*Allobates femoralis* żywi się drobnymi owadami. W terrarium podstawą pokarmu są nielotne muszki owocowe, uzupełniane skoczogonkami, bardzo małymi świerszczami, małymi larwami barciaka i planktonem łąkowym.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Allobates femoralis* jest aktywny w dzień, a samce są terytorialne.
NATURALNY ZASIĘG	Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gujana Francuska, Gujana, Peru i Surinam.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/allobates-femoralis