herpy

DRZEWOŁAZY

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo to niewielka, aktywna za dnia żaba o długości około 3 cm, pochodząca z lasów deszczowych u podnóża Andów w Ekwadorze i północnym Peru. Dorosłe osobniki mają czerwony grzbiet, czarne boki, niebieski brzuch i żółte plamy przy nogach. Naśladują toksyczne *Ameerega bilinguis* i *Ameerega parvula*, same jednak nie są toksyczne. Gatunek jest utrzymywany tylko sporadycznie, dlatego zalecenia dotyczące hodowli opierają się na klimacie i na pokrewnym *Allobates femoralis*.

Rodzina: Aromobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Temperatura w nocy	**21-23 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**8-20**
Czas do wyklucia	**15-20 dni**
Okres larwalny	**40-50 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Allobates zaparo* jest skąpa. Gatunek jest utrzymywany tylko sporadycznie, a rozmnażanie w niewoli nie zostało opisane.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 24-27 °C w dzień i 21-23 °C w nocy. Wartości te odpowiadają klimatowi nizin Ekwadoru u podnóża Andów. Wahania w ciągu roku powinny być niewielkie, 1-2 °C. Nie ma okresu spoczynku zimowego.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w środku dnia i blisko 100 % rano i wieczorem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij płaską szklaną miskę z 1-2 cm wody, z której żaby łatwo wychodzą. Dorosłe osobniki korzystają z niej przy wypuszczaniu kijanek.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom: 10-12 godzin dziennie światła LED o spektrum odpowiednim dla roślin. Nie udokumentowano, by *Allobates zaparo* potrzebowała UVB.
ŻYWIENIE	W naturze ważną częścią diety są mrówki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Allobates zaparo* jest aktywna za dnia i żyje na ściółce. Samce nawołują z wierzchu liści, by przywabić samice.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador i Peru.