herpy

DRZEWOŁAZY

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri to dzienny drzewołaz o długości niespełna 4 cm, pochodzący z wilgotnych lasów u wschodniego podnóża Andów w północnym Peru. Samiec opiekuje się jajami i przenosi kijanki do wody, a gatunek trzeba trzymać w niższej temperaturze niż większość drzewołazów. Wiedza o hodowli jest skąpa, a w naturze gatunek jest narażony na wyginięcie.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 55 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-21 °C**
Temperatura w nocy	**13-17 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Dojrzałość płciowa	**12-13 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**40**
Czas do wyklucia	**10 dni**
Okres larwalny	**50-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega bassleri* jest skąpa. Gatunek żyje w wilgotnym lesie nad strumieniami na wysokości 300-1200 m, gdzie powietrze jest chłodniejsze niż w siedliskach większości drzewołazów.
TEMPERATURA	Gatunku nie wolno trzymać w zbyt wysokiej temperaturze. W dzień odpowiednie jest 18-21 °C, a w nocy temperatura powinna spaść o 4-6 °C, do około 13-17 °C. Różnica między porami roku wynosi tylko 1-2 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Rano i wieczorem jest bliska 100 % i pojawia się mgła, a w środku dnia może spaść do około 70 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W terrarium powinna stać miska z 1-2 cm wody, a przy rozmnażaniu na kijanki przeznacza się stałą część wodną lub małe pojemniki. Używaj wody deszczowej lub z odwróconej osmozy i wymieniaj ją kilka razy w tygodniu.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje na dnie lasu, gdzie dociera niewiele światła. Wystarczy oświetlenie LED o widmie odpowiednim dla roślin i dzień trwający 10-12 godzin.
ŻYWIENIE	Gatunek przyjmuje typowe drobne owady karmowe: muszki owocowe, skoczogonki, świeżo wyklute świerszcze, najmniejsze larwy barciaka oraz drobne owady zebrane czerpakiem na łące.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i naziemny. Samiec jest terytorialny i nawołuje, broniąc swojego rewiru, dlatego zwierzęta potrzebują wielu kryjówek i przerwanych linii widzenia.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ameerega-bassleri