herpy

DRZEWOŁAZY

Ecuador Poison Frog

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis to mały, dzienny drzewołaz o długości 17-23 mm, zamieszkujący ściółkę lasu deszczowego w północno-zachodniej części niziny Amazonki. Grzbiet jest czarny z czerwonymi brodawkami, a spód ciała jasnoniebieski z czarnym wzorem. Gatunek jest rzadko utrzymywany, a wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates bilinguis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-23 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-26 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-16**
Czas do wyklucia	**10-22 dni**
Okres larwalny	**70-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega bilinguis* jest skąpa, ale gatunek jest utrzymywany w niewielkiej liczbie, a podstawowe parametry terrarium są znane. Utrzymuje się go jak inne małe gatunki *Ameerega* ze ściółki lasu deszczowego.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień wynosi 25-26 °C, a w nocy obniża się ją o 4-5 stopni do 20-22 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna być bliska 100 % rano i wieczorem, najlepiej z mgłą, a w ciągu dnia może spadać do 70-80 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płaska miska z 1-2 cm wody daje żabom możliwość picia i jest niezbędna, jeśli planujesz rozmnażanie, bo samiec wypuszcza w niej kijanki. Miska powinna mieć skos lub kamienie, aby żaba mogła z niej wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetlenie ma przede wszystkim zapewnić roślinom rytm dobowy około 12 godzin i do tego wystarczy lampa LED do roślin. UVB nie jest niezbędne dla drzewołazów, więc jest opcjonalne.
ŻYWIENIE	Pokarm stanowią małe, żywe stawonogi: skoczogonki i muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), mikroświerszcze, przesiany plankton łąkowy i małe równonogi. Żaba jest mała, więc większe owady karmowe, takie jak *Drosophila hydei*, nadają się tylko dla dorosłych.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i żyje głównie na ziemi, ale samce chętnie wspinają się na lekko wyniesione miejsca, aby nawoływać.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia, Ekwador i Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ameerega-bilinguis