herpy

DRZEWOŁAZY

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi to drzewołaz o czerwonym grzbiecie, mierzący około 3 cm, znany wyłącznie z podnóża gór w okolicach Tarapoto w północnym Peru. Gatunek jest zagrożony w naturze, a wiedza o jego hodowli jest skąpa, dlatego ten poradnik opiera się na klimacie, siedlisku i bliskich krewniakach: *Ameerega bassleri* i *Ameerega pepperi*.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**12-13 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**22-44**
Czas do wyklucia	**10 dni**
Okres larwalny	**50-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega cainarachi* jest skąpa. Gatunek żyje na tym samym obszarze co *Ameerega bassleri* i *Ameerega pepperi*, a dane rozrodcze zostały zapożyczone od nich (zob. Rozmnażanie).
TEMPERATURA	W dzień odpowiednia jest temperatura 22-26 °C, a w nocy powinna spadać nawet o 5 °C, do około 19-22 °C. Różnica między porami roku wynosi tylko 1-2 °C. Nie ma okresu zimowania.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %: około 70 % w środku dnia i blisko 100 % z mgłą rano i wieczorem. Zraszaj ręcznie albo używaj systemu zraszania i zamgławiacza kilka razy dziennie.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z 1-2 cm wody, do której łatwo wejść i z której łatwo wyjść. Używaj wody deszczowej, wody z odwróconej osmozy lub odchlorowanej wody z kranu i wymieniaj ją co drugi dzień, aby nie gromadziły się bakterie.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetlenie ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby roślin: lampy LED do wzrostu roślin przez 10-12 godzin dziennie z wyraźną nocą.
ŻYWIENIE	Żaby przyjmują typowe drobne owady karmowe: muszki owocowe (*Drosophila melanogaster* i *Drosophila hydei*), skoczogonki, małe równonogi, świeżo wyklute świerszcze, najmniejsze larwy barciaka i drobne owady odłowione siatką z łąki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ameerega cainarachi* jest aktywny w dzień i przebywa na dnie lasu. Samce w tym rodzaju są terytorialne i nawołują ze stałych miejsc.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ameerega-cainarachi