herpy

DRZEWOŁAZY

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli to mały, aktywny za dnia drzewołaz o długości 17-22 mm, z jasnymi pasami po bokach i niebieskim brzuchem, żyjący w ściółce lasu deszczowego na dużej części nizin Amazonii. Samiec przenosi kijanki do płynącej wody, a kijanki wymagają prądu w wodzie. Gatunek jest pospolity w naturze, ale rzadki w hodowli.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-22 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**6-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**23-25 °C**
Temperatura w nocy	**19-21 °C**
Wilgotność	**65-90%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**7-12 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**6-33**
Czas do wyklucia	**4-16 dni**
Okres larwalny	**55-65 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega hahneli* jest ograniczona, a wymagania mogą się różnić między poszczególnymi formami i możliwymi gatunkami kryptycznymi.
TEMPERATURA	*Ameerega hahneli* potrzebuje 23-25 °C w dzień i 19-21 °C w nocy. Świetlówki umieszczone poza terrarium mogą dostarczać zarówno światła, jak i potrzebnego ciepła.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 65-90 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zawsze musi być dostępna odrobina wody, np. w rynience drenażowej lub w płytkiej misce z 1-2 cm wody. W porze suchej nie opróżnia się rynienki, żeby zwierzęta nadal miały dostęp do wody.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetleniem mogą być świetlówki lub LED o spektrum odpowiednim dla roślin, przez 10-12 godzin.
ŻYWIENIE	Podstawowym pokarmem jest mała muszka owocowa (*Drosophila melanogaster*). Dorosłe osobniki biorą też dużą muszkę owocową (*Drosophila hydei*), ale często ją pomijają, bo jest dla nich trochę za duża.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny za dnia i naziemny, ale najbardziej aktywny wcześnie rano oraz późnym popołudniem i wieczorem; przez resztę dnia jest bardziej płochliwy.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia, Boliwia, Peru, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Gujana Francuska i Surinam.