herpy

DRZEWOŁAZY

# *Ameerega pepperi*

*Ameerega pepperi* to mały, czarny drzewołaz z żółtymi paskami i czerwonym, pomarańczowym lub żółtym rysunkiem, pochodzący ze środkowego Peru. Żyje przy strumieniach w lesie na wysokości 380-1000 m n.p.m. i jest gatunkiem narażonym z powodu wycinki lasów. Wiedza o jego hodowli jest skąpa, dlatego opiera się ona na warunkach panujących w siedlisku i na blisko spokrewnionych gatunkach.

Rodzina: Dendrobatidae

## NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **3 cm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **8-12 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i mokradła** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Doświadczony** |

### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 45 × 45 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **21-25 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-21 °C** |
| Wilgotność | **75-100%** |
| Woda | **Miska z wodą**<br>głębokość 1-2 cm |
| UVB | **Opcjonalne**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach** |

### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **Na ziemi** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **22-44** |
| Okres larwalny | **35-60 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Gotowa karma** |
| Opieka nad potomstwem | **Pilnuje jaj i nosi kijanki** |

### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Narażony (VU)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Ameerega pepperi* jest skąpa. Gatunek żyje przy strumieniach w wilgotnym lesie na wysokości 380-1000 m n.p.m. |
| **TEMPERATURA** | W dzień temperatura powinna wynosić 21-25 °C, a w nocy 18-21 °C. Nie może przekraczać 27 °C, ponieważ drzewołazy źle znoszą ciepło. Latem może być konieczny wentylator lub chłodne pomieszczenie. Nie ma okresu spoczynku zimowego. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 75-100 %. Zraszaj 1-3 razy dziennie wodą deszczową lub z odwróconej osmozy albo zastosuj system zraszający, tak aby ściółka z liści była wilgotna, ale nie przemoczona. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Wystarczy płytka miska z 1-2 cm wody i kamieniem lub gałęzią, po której zwierzę może wyjść na ląd. Używaj wody deszczowej, z odwróconej osmozy lub odchlorowanej i wymieniaj ją co 2-3 dni. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Zapewnij oświetlenie odpowiednie dla roślin przez 10-12 godzin dziennie, z cieniem i kryjówkami. Nie udokumentowano, by UVB było dla tego gatunku niezbędne, ale można zastosować słabe źródło UVB (strefa Fergusona 1). |
| **ŻYWIENIE** | *Ameerega pepperi* jest mały i przyjmuje drobne owady karmowe: muszki owocowe (głównie *Drosophila melanogaster*, rzadziej *Drosophila hydei*), skoczogonki i małe równonogi. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Samce są terytorialne i nawołują z kamieni. Gatunek najlepiej trzymać w parze, w terrarium z wieloma kryjówkami. Żab nie należy brać do ręki, ponieważ ich skóra jest delikatna, a manipulowanie nimi powoduje stres. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Peru. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ameerega-pepperi