herpy

DRZEWOŁAZY

Peru Poison Frog

Ameerega petersi

Ameerega petersi to mały, dzienny drzewołaz o długości 24-30 mm z lasu deszczowego u podnóża Andów we wschodnim Peru i zachodniej Brazylii. Grzbiet jest brązowy z jasnym, skośnym paskiem bocznym. Gatunek rzadko spotyka się w hodowli, a wiedza o jego utrzymaniu jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**2-3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Temperatura w nocy	**21-25 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-16**
Czas do wyklucia	**10-22 dni**
Okres larwalny	**70-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega petersi* jest skąpa, ale gatunek jest utrzymywany w niewielkiej liczbie, a podstawowe parametry terrarium są znane. Hoduje się go tak jak inne małe gatunki *Ameerega* żyjące w ściółce lasu deszczowego.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień wynosi 25-28 °C, a w nocy obniża się ją o 3-4 stopnie do 21-25 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %: blisko 100 % rano i wieczorem, najlepiej z mgłą, i około 70-80 % w środku dnia.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płaska miska z 1-2 cm wody. Miska musi być na tyle płytka, żeby młoda żaba mogła z niej wyjść, i mieć kamienie lub mech przy brzegu. Często wymieniaj wodę i myj miskę ciepłą wodą bez mydła.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij oświetlenie LED o spektrum odpowiednim dla roślin przez 10-12 godzin dziennie. UVB nie jest konieczne dla drzewołazów; słabe źródło UVB (strefa Fergusona 1) jest opcjonalne.
ŻYWIENIE	Dieta składa się z małych żywych stawonogów ze ściółki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Samce w obrębie rodzaju nawołują i bronią małych terytoriów. Nie opisano, jak *Ameerega petersi* zachowuje się w grupach, dlatego para jest najbezpieczniejszą formą utrzymania.
NATURALNY ZASIĘG	Peru i Brazylia.