herpy

DRZEWOŁAZY

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta to niewielki, aktywny w dzień drzewołaz o ciemnobrązowym grzbiecie, czarnych bokach z jasnymi paskami oraz żółtych do czerwonych plamach na udach. Żyje na dnie lasu od nizin Amazonii po podnóża Andów w Boliwii, Peru, Kolumbii i Brazylii, a izolowana populacja występuje w Wenezueli. Gatunek jest utrzymywany rzadko, dlatego zalecenia hodowlane opierają się na klimacie w zasięgu występowania i na blisko spokrewnionych gatunkach.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**22-28 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**15-40**
Czas do wyklucia	**15-22 dni**
Okres larwalny	**40-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Ameerega picta* jest skromna. Gatunek jest hodowany rzadko, a duży zakres wysokości, na których występuje, utrudnia określenie, do jakiego klimatu przystosowana jest dana populacja.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-25 °C w dzień, a w nocy pozwól temperaturze spaść o 3-4 °C, do 18-22 °C. Wahania w ciągu roku powinny być niewielkie, 1-2 °C. Żaby źle znoszą upał: temperatury powyżej około 28 °C są niebezpieczne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w środku dnia i blisko 100 % rano i wieczorem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij płytkie naczynie z 1-2 cm wody, z którego żaby łatwo wyjdą, z kamieniami lub mchem przy brzegu. Dorosłe osobniki korzystają z niego, gdy wypuszczają kijanki.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom: 10-12 godzin dziennie lampami LED o spektrum odpowiednim dla roślin. Nie udokumentowano, by *Ameerega picta* potrzebowała UVB.
ŻYWIENIE	W naturze żaba żywi się drobnymi stawonogami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ameerega picta* jest aktywna w dzień i żyje głównie na ziemi. Samce z tego rodzaju bronią niewielkich terytoriów, więc najbezpieczniejsze jest trzymanie pary. Nie trzymaj dwóch samców razem w małym terrarium.
NATURALNY ZASIĘG	Boliwia, Brazylia, Peru, Kolumbia i Wenezuela.