herpy

DRZEWOŁAZY

Cordillera Azul Poison Frog

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris to mały, ciemny drzewołaz o długości 21-25 mm, z jasnymi paskami po bokach i czerwono- lub pomarańczowo-czarnym, marmurkowym brzuchem. Występuje wyłącznie w lasach Cordillera Azul w środkowym Peru i jest zagrożony. Gatunek rzadko trafia do hodowli, a wiedza o jego utrzymaniu jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates rubriventris*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**21-25 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Temperatura w nocy	**21-25 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-16**
Czas do wyklucia	**10-22 dni**
Okres larwalny	**70-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Ameerega rubriventris* jest skąpa. Klimat w lasach górskich Cordillera Azul jest ciepły i wilgotny przez cały rok, a gatunek utrzymuje się tak jak inne małe *Ameerega* ze ściółki lasu deszczowego.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień wynosi 25-28 °C, a w nocy obniża się ją o 3-4 stopnie do 21-25 °C. W ciągu roku temperatura waha się tylko o 1-2 stopnie, a zimowanie nie jest potrzebne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień i blisko 100 % rano i wieczorem, najlepiej z mgłą.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z 1-2 cm wody, do której łatwo wejść i z której łatwo wyjść. Używaj deszczówki, wody z odwróconej osmozy lub odchlorowanej wody z kranu i wymieniaj wodę co drugi dzień, aby nie gromadziły się bakterie.
OŚWIETLENIE I UVB	Oświetlenie ma przede wszystkim służyć roślinom: lampa LED do wzrostu roślin przez 10-12 godzin dziennie i wyraźna noc. UVB nie jest niezbędne dla drzewołazów; słaba lampa UVB (strefa Fergusona 1) jest opcjonalna.
ŻYWIENIE	Żaby zjadają małe żywe stawonogi: muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*, a dorosłym także *D. hydei*), skoczogonki, mikroświerszcze, małe równonogi i przesiany plankton łąkowy.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ameerega rubriventris* jest aktywny w dzień i przebywa na dnie lasu, ale chętnie się wspina. Samiec nawołuje ptasim piskiem, najczęściej 2-3 krótkimi gwizdami z rzędu.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.