herpy

DRZEWOŁAZY

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei to pomarańczowoczerwony drzewołaz o długości około 4 cm, znany wyłącznie z Cordillera Azul na wschodnich stokach Andów w Peru. Żyje w chłodnym lesie górskim na wysokości około 1300-1500 m n.p.m., jest zagrożony utratą siedlisk i rzadko spotykany w hodowli. Wymaga chłodnego terrarium.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4-5 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**17-20 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**15-16 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-45**
Czas do wyklucia	**30 dni**
Okres larwalny	**55-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ameerega silverstonei* jest niewielka. Opiera się ona na klimacie lasu górskiego na wysokości około 1300-1500 m n.p.m.: chłodnym, wilgotnym i stabilnym przez cały rok.
TEMPERATURA	W dzień powinno być 20-24 °C, najlepiej bliżej dolnej granicy, a w nocy 17-20 °C. Temperatura nie może przekraczać 25 °C. Chłodne powietrze nie jest problemem, o ile wahania są niewielkie.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %: około 70 % w środku dnia i do 100 % rano i wieczorem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płaska miska z 1-2 cm wody. Używaj wody deszczowej, wody z odwróconej osmozy lub wody odchlorowanej i często ją wymieniaj. Woda powinna być chłodna, podobnie jak powietrze.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje na zacienionym dnie lasu, więc światło powinno być umiarkowane i musi być dostępny cień. Wystarczą świetlówki lub LED o spektrum przyjaznym roślinom przez 10-12 godzin dziennie.
ŻYWIENIE	*Ameerega silverstonei* przyjmuje owady od małych do dużych: duże muszki owocowe (*Drosophila hydei*), świeżo wyklute świerszcze, najmniejsze larwy barciaka i drobne owady złowione siatką na łące.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest płochliwy i często chowa się pod liśćmi lub korą korkową. Można go trzymać w grupach, ale samce są terytorialne, dlatego trzymaj parę lub grupę z przewagą samic nad samcami.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ameerega-silverstonei