herpy

DRZEWOŁAZY

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata to duży, aktywny w dzień drzewołaz o długości 4-6 cm, zamieszkujący dno lasu w Amazonii. Jest czarny z dwoma jasnozielonymi pasami wzdłuż boków, a samiec często przenosi na grzbiecie do wody 15-30 kijanek naraz. Ta żaba wymaga przestronniejszego terrarium niż małe drzewołazy.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4-6 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**70 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**23-25 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**15-40**
Czas do wyklucia	**15-22 dni**
Okres larwalny	**40-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Terrarium o wymiarach co najmniej 70 × 50 × 50 cm (długość, szerokość, wysokość) wystarczy dla dwóch dorosłych *Ameerega trivittata*.
TEMPERATURA	Temperaturę w dzień utrzymuje się na poziomie 23-25 °C, a w nocy obniża o 3-4 °C, do około 19-22 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-90 % przez większość dnia, blisko 100 % rano i wieczorem, a w środku dnia może spaść do około 70 %. Dłuższy czas poniżej 70 % jest niebezpieczny, zwłaszcza jeśli żaba nie ma dostępu do wody.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płaska miska z 1-2 cm wody. Miska musi być na tyle płytka, by młode mogły z niej wyjść, i mieć przy brzegu kamienie lub mech. Miskę i wodę wymienia się często, a miskę myje gorącą wodą bez mydła.
OŚWIETLENIE I UVB	Nie udokumentowano, by UVB było konieczne dla drzewołazów ogólnie, a dla tego konkretnego gatunku brak jest informacji. Słabe oświetlenie UVB (strefa Fergusona 1) jest opcjonalne.
ŻYWIENIE	Dieta składa się z małych żywych stawonogów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Samce głośno nawołują i bronią niewielkich terytoriów, a samice są spokojne. Nie udokumentowano, jak gatunek zachowuje się w grupach w niewoli, dlatego najbezpieczniejsze jest trzymanie par.
NATURALNY ZASIĘG	Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Gujana, Peru, Surinam i Wenezuela.