herpy

DRZEWOŁAZY

Cauca Poison Frog

# *Andinobates bombetes*

*Andinobates bombetes* to mały, aktywny za dnia drzewołaz o długości 17-19 mm, pochodzący z lasów mglistych kolumbijskich Andów. Jest czarny do ciemnobrązowego z czerwonym lub pomarańczowym rysunkiem na przedniej części ciała i jest uzależniony od wypełnionych wodą bromeliad. W naturze gatunek ma status narażonego, a wiedza o jego utrzymaniu jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae  Dawna nazwa: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*

## NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **17-19 mm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **5-10 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Las górski** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Doświadczony** |

### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 50 × 60 cm**<br>D × S × W dla 5 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **22-25 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-21 °C** |
| Wilgotność | **80-100%** |
| Woda | **Bez miski z wodą** |
| UVB | **Opcjonalne**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach lub w grupach** |

### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **Na ziemi** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **1-2** |
| Czas do wyklucia | **16-24 dni** |
| Okres larwalny | **108-112 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Glony i rośliny i gotowa karma** |
| Opieka nad potomstwem | **Nosi kijanki** |

### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Narażony (VU)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o utrzymaniu *Andinobates bombetes* jest skąpa. Opiera się na środowisku naturalnym, chłodnym i bardzo wilgotnym lesie górskim z grubą warstwą liści i bromeliadami, oraz na hodowli w niewoli w Kolumbii. |
| **TEMPERATURA** | Temperatura w dzień powinna wynosić 22-25 °C, a w nocy może spadać do 18-21 °C, jak w lesie górskim. Utrzymuj temperaturę poniżej 27 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 % i nigdy nie spadać poniżej 70 %. Zraszaj dwa razy dziennie, rano i po południu, albo stosuj zamgławiacz lub system zraszający z wodą z odwróconej osmozy lub deszczówką. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Miska z wodą nie jest potrzebna; żaby piją krople z roślin i wodę ze zraszania. Dla kijanek używa się bromeliad z wodą w kątach liści lub małych plastikowych kubeczków z 2-3 cm wody. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom: lampa do roślin włączona przez 10-12 godzin dziennie zapewnia rytm dobowy i wzrost. |
| **ŻYWIENIE** | Pokarm stanowią małe stawonogi: skoczogonki, małe muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), małe równonogi i świeżo wyklute świerszcze. Młode tuż po metamorfozie przyjmują tylko skoczogonki. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Andinobates bombetes* jest aktywny za dnia i trzyma się dolnych partii terrarium, w warstwie liści i przy bromeliadach. Samce nawołują głównie rano. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Kolumbia. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/andinobates-bombetes