herpy

DRZEWOŁAZY

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae został opisany jako najmniejszy drzewołaz: dorosłe osobniki mierzą zaledwie około 13 mm. Żyje w ściółce nizinnego lasu w Bocas del Toro w północno-zachodniej Panamie, zarówno na wyspach, jak i na stałym lądzie. Gatunek jest zagrożony, a wiedza o jego utrzymaniu jest niemal żadna.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Ranitomeya claudiae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-25 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-8**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Andinobates claudiae* jest niemal żadna. Zalecenia opierają się na środowisku naturalnym: ciepłym, wilgotnym lesie nizinnym z opadami przez większą część roku i grubą warstwą ściółki.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 22-25 °C, a w nocy 19-22 °C. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C jest niebezpieczna, dlatego terrarium nie może stać w słońcu ani blisko źródła ciepła.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj terrarium 1-2 razy dziennie wodą deszczową lub wodą z odwróconej osmozy, tak aby liście pozostawały wilgotne, albo użyj systemu zraszającego z timerem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dorosłe żaby nie potrzebują miski z wodą; pobierają wodę przez skórę ze zraszania i wilgotnych liści.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i żyje w cieniu na dnie lasu. Oświetlenie LED przez około 12 godzin dziennie wystarcza dla roślin.
ŻYWIENIE	*Andinobates claudiae* jest tak mały, że pokarm musi być najmniejszy z dostępnych: skoczogonki, małe nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*) i małe równonogi. Nawet zwykłe muszki owocowe mogą być za duże.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i trzyma się ściółki oraz kryjówek. Samce nawołują ze stałych miejsc i bronią swojego terytorium, dlatego trzyma się je w parach.
NATURALNY ZASIĘG	Panama.