herpy

DRZEWOŁAZY

Tolima Poison Frog

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 16-19 mm, czarny lub ciemnobrązowy z czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi plamami. Znany jest tylko z niewielkiego fragmentu lasu w północnej części Tolimy w Kolumbii. Gatunek jest narażony na wyginięcie i praktycznie nie jest utrzymywany, dlatego zalecenia opierają się na chłodnym, wilgotnym klimacie górskim jego siedliska.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Ranitomeya dorisswansonae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-19 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-22 °C**
Temperatura w nocy	**14-17 °C**
Wilgotność	**85-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-2**
Czas do wyklucia	**16-24 dni**
Okres larwalny	**108-152 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Andinobates dorisswansonae* jest skąpa, a gatunek praktycznie nie występuje w niewoli.
TEMPERATURA	Temperatury w siedlisku gatunku nie mierzono. 18-22 °C w dzień i 14-17 °C w nocy odpowiada lasowi na wysokości około 1.800 m n.p.m. Gatunek źle znosi ciepło, a dłuższy czas powyżej 25 °C obciąża zwierzęta.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 85-100 %. Dokładnie zraszaj liście i rośliny raz lub dwa razy dziennie wodą deszczową lub z odwróconej osmozy albo użyj zamgławiacza sterowanego timerem. Podłoże ma być wilgotne, ale nie mokre.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek nie potrzebuje części wodnej. Zwierzęta czerpią wilgoć z liści, roślin i zraszania. Kijanki rozwijają się w wodzie w lejkach liściowych bromelii.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij 10-12 godzin światła dziennie z oświetlenia LED, aby rośliny dobrze rosły. Las ma gęste sklepienie koron, więc światło nie powinno być silne, a zwierzęta muszą mieć możliwość schronienia się w cieniu.
ŻYWIENIE	*Andinobates dorisswansonae* mierzy zaledwie 16-19 mm i zjada drobne stawonogi, w naturze zwłaszcza mrówki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i żyje na ziemi w warstwie liści. Zachowania terytorialne nie są udokumentowane. Parę można trzymać razem w terrarium 45 × 45 × 45 cm. Żab nie należy brać do rąk, ponieważ ich skóra jest delikatna.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/andinobates-dorisswansonae