herpy

DRZEWOŁAZY

## Blue-bellied Poison Frog

# *Andinobates minutus*

*Andinobates minutus* to jeden z najmniejszych drzewołazów, mierzący zaledwie 13-16 mm od pyska do kloaki. Żyje w ściółce wilgotnych lasów nizinnych od środkowej Panamy po pacyficzne wybrzeże Kolumbii, a samiec przenosi kijanki do bromeliowatych. Gatunek nie jest odławiany na potrzeby handlu i niemal nie jest utrzymywany, dlatego wiedza o jego hodowli jest bardzo skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae  Dawna nazwa: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **13-16 mm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **5-10 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Las deszczowy** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 45 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **22-25 °C** |
| Temperatura w nocy | **19-22 °C** |
| Wilgotność | **80-100%** |
| Woda | **Bez miski z wodą** |
| UVB | **Opcjonalne**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **Na ziemi** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **1-8** |
| Okres larwalny | **60-80 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Gotowa karma** |
| Opieka nad potomstwem | **Nosi kijanki** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o utrzymaniu *Andinobates minutus* jest bardzo skąpa. Zalecenia opierają się na środowisku naturalnym: ciepłym, wilgotnym lesie nizinnym z opadami przez większą część roku i grubą warstwą ściółki. |
| **TEMPERATURA** | Temperatura w dzień powinna wynosić 22-25 °C, a w nocy 19-22 °C. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C jest niebezpieczna, więc terrarium nie może stać w słońcu ani blisko źródła ciepła. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj terrarium 1-2 razy dziennie wodą deszczową lub wodą z odwróconej osmozy, tak aby liście pozostawały wilgotne, albo użyj systemu zraszania z timerem. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Dorosłe żaby nie potrzebują miski z wodą; pobierają wodę przez skórę ze zraszania i z wilgotnej ściółki. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest aktywny w dzień i żyje w cieniu na dnie lasu. Oświetlenie LED przez około 12 godzin dziennie wystarcza dla roślin. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze *Andinobates minutus* żywi się roztoczami, mrówkami, skoczogonkami i larwami owadów. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunek jest aktywny w dzień i trzyma się ściółki oraz kryjówek. Samce nawołują ze stałych miejsc i bronią swojego terytorium, dlatego trzyma się je w parach. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Kolumbia i Panama. |