herpy

DRZEWOŁAZY

Andean Poison Frog

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 15-20 mm z kolumbijskich Andów, gdzie żyje w ściółce wilgotnych lasów górskich w departamentach Antioquia i Caldas. Gatunek jest w naturze narażony na wyginięcie, a wiedza o jego utrzymaniu jest niemal żadna.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 50 × 60 cm** D × S × W dla 5 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-2**
Czas do wyklucia	**16-24 dni**
Okres larwalny	**108-112 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Andinobates opisthomelas* jest niemal żadna, a gatunek raczej nie jest hodowany. Zalecenia opierają się na siedlisku, czyli chłodnym i wilgotnym lesie górskim ze ściółką i bromeliami, oraz na bliskich krewnych.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 22-25 °C, a w nocy może spadać do 18-21 °C, jak w lesie górskim. Utrzymuj temperaturę poniżej 27 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 % i nigdy nie spadać poniżej 70 %. Zraszaj dwa razy dziennie, rano i po południu, albo używaj zamgławiacza lub systemu deszczowego z wodą z odwróconej osmozy lub deszczówką.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Miska z wodą nie jest potrzebna; żaby piją krople z roślin i wodę ze zraszania. Dla kijanek używa się bromelii z wodą w kątach liści albo małych plastikowych kubeczków z 2-3 cm wody.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim roślinom: oświetlenie roślinne przez 10-12 godzin dziennie zapewnia rytm dobowy i wzrost roślin.
ŻYWIENIE	Pokarm stanowią małe stawonogi: skoczogonki, małe muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*) i małe równonogi. Świeżo przeobrażone młode jedzą tylko skoczogonki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Andinobates opisthomelas* jest aktywny w dzień i żyje na ziemi, więc trzyma się nisko w terrarium, w ściółce i przy bromeliach.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/andinobates-opisthomelas