herpy

DRZEWOŁAZY

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 17-19 mm, z brązowym grzbietem i metalicznie lśniącą, żółto-brązową głową. Znany jest tylko z niewielkiego fragmentu lasu mglistego w północnej części departamentu Tolima w Kolumbii, został opisany dopiero w 2007 roku i praktycznie nie jest hodowany. Zalecenia dotyczące utrzymania opierają się więc na chłodnym, wilgotnym klimacie górskim jego siedliska.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-19 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**19-23 °C**
Temperatura w nocy	**15-19 °C**
Wilgotność	**85-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-2**
Czas do wyklucia	**16-24 dni**
Okres larwalny	**108-152 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Andinobates tolimensis* jest bardzo skąpa, a gatunek praktycznie nie jest hodowany w niewoli.
TEMPERATURA	Utrzymuj 19-23 °C w dzień i 15-19 °C w nocy, co odpowiada lasowi mglistemu na wysokości około 1800 m. Żaby z chłodnego lasu górskiego źle znoszą wysokie temperatury, więc terrarium musi stać w chłodnym miejscu, bez słońca z okien i bez lamp grzewczych.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 85-100 % przez cały rok, a warstwa liści musi być stale wilgotna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek nie potrzebuje części wodnej. Woda znajduje się w lejkach liściowych bromelii, gdzie rozwijają się kijanki, i trzeba ją regularnie wymieniać, żeby nie zmętniała.
OŚWIETLENIE I UVB	*A. tolimensis* żyje w gęstym lesie, gdzie przy ziemi jest mało światła, więc oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 10-12 godzin światła dziennie z LED lub świetlówek i ciemność w nocy.
ŻYWIENIE	Pokarm stanowią małe stawonogi: najmniejsze skoczogonki i muszki owocowe (*Drosophila*) oraz małe równonogi. Karm 3-4 razy w tygodniu i dbaj, żeby w terrarium zawsze były żywe owady karmowe.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zachowanie w niewoli nie jest udokumentowane. Żaba żyje na dnie lasu w cieniu i chowa się w zagłębieniach między korzeniami, w liściach i mchu.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.