herpy

DRZEWOŁAZY

Yellow-striped Poison Frog

Dendrobates truncatus

Dendrobates truncatus to dzienny drzewołaz o długości około 3 cm z północnej Kolumbii, czarny, z dwoma żółtymi pasami biegnącymi przez grzbiet i białymi plamami na bokach. Jest odporny, znosi nieco suchsze powietrze niż wielu jego krewnych i dobrze czuje się w małej grupie, ale trudno go skłonić do regularnego rozmnażania.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Phyllobates truncatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Suchy las i las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-24 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**10-15 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-6**
Czas do wyklucia	**10-14 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *Dendrobates truncatus* potrzebuje terrarium lasu deszczowego o wymiarach co najmniej 50 × 50 × 50 cm. Grupa wymaga więcej miejsca, zwłaszcza większej powierzchni dna; licz około 40 litrów na żabę.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 22-24 °C, a w nocy obniża się ją o 3-4 stopnie, do 18-21 °C. Gatunek krótkotrwale znosi 18-27 °C, ale powyżej 29 °C jest niebezpiecznie.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w środku dnia i najlepiej dochodzić do 100 % rano i wieczorem. System zraszający i wytwornica mgły najbardziej ułatwiają utrzymanie tego rytmu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z 1-2 cm wody i pochyłym brzegiem lub kamieniem, dzięki któremu żaby łatwo z niej wyjdą. Miska służy też jako miejsce dla kijanek, jeśli rodzice sami opiekują się potomstwem.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim roślinom. Świetlówki lub oświetlenie LED o temperaturze barwowej około 6 500 K dają naturalne kolory i dobry wzrost roślin, a 12 godzin światła dziennie to powszechna praktyka. Żarówki i oświetlenie halogenowe wydzielają zbyt dużo ciepła.
ŻYWIENIE	*Dendrobates truncatus* zjada małe stawonogi, w naturze zwłaszcza mrówki, roztocza i larwy owadów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Dendrobates truncatus* jest aktywny w dzień i ani płochliwy, ani natarczywy.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/dendrobates-truncatus