herpy

DRZEWOŁAZY

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi to mały, czerwony, prążkowany drzewołaz o długości 19-27 mm, pochodzący z południowo-zachodniego Ekwadoru i północno-zachodniego Peru. To właśnie ta żaba od dziesięcioleci sprzedawana jest jako "tricolor" i prawdopodobnie jest najczęściej utrzymywanym i rozmnażanym drzewołazem w ogóle: odporny, śmiały, chętnie się odzywający i płodny.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**19-27 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-14 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Suchy las**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**5-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-40**
Czas do wyklucia	**9-14 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**43-89 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 40 cm wystarczy dla jednego samca i dwóch samic *Epipedobates anthonyi*. Grupa 5-10 osobników potrzebuje co najmniej 60 × 60 × 40 cm, a więcej zwierząt wymaga większej powierzchni dna.
TEMPERATURA	Utrzymuj w dzień 22-26 °C ze strefami chłodniejszymi i cieplejszymi, a w nocy pozwól temperaturze spaść do temperatury pokojowej, około 18-21 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Gatunek znosi spadki do 50 % przez krótki czas, jeśli ma dostęp do wody, ale niska wilgotność bez wody może szybko okazać się śmiertelna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Przygotuj jedno lub kilka małych oczek wodnych z około 2 cm wody, np. podstawki, poidełka lub połówki łupin orzecha brazylijskiego, z których żaby łatwo wyjdą.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest dla roślin. Świetlówki lub listwy LED przez około 12 godzin dziennie wystarczą, a długość dnia może nieco zmieniać się w ciągu roku.
ŻYWIENIE	*Epipedobates anthonyi* jest mały, ale żarłoczny i przyjmuje stosunkowo dużą zdobycz.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Epipedobates anthonyi* jest aktywny w dzień, śmiały i często widoczny, a samce nawołują trylem, głównie rano i po zraszaniu.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador i Peru.