herpy

DRZEWOŁAZY

Marbled Poison Frog

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri to mały, aktywny za dnia drzewołaz o długości około 17-24 mm, z ciemnobrązowym grzbietem i ciągłym, jasnym paskiem wzdłuż boku. Zamieszkuje nizinne lasy deszczowe wzdłuż wybrzeża Pacyfiku od południowo-zachodniej Kolumbii po najdalej na północny zachód wysunięty skrawek Ekwadoru. Gatunek jest raczej nieobecny w hodowlach, a wiedza o jego utrzymaniu jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-24 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-30**
Czas do wyklucia	**9-14 dni**
Okres larwalny	**42-70 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Epipedobates boulengeri* jest skąpa, a gatunek praktycznie nie występuje w hodowlach.
TEMPERATURA	Utrzymuj 22-26 °C w dzień, z nieco chłodniejszymi i nieco cieplejszymi miejscami w terrarium, oraz 19-22 °C w nocy. Zwykle wystarcza temperatura pokojowa i oświetlenie; maty grzewcze są zbędne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj kilka razy dziennie lub użyj systemu zraszającego, np. trzy razy dziennie po 20-60 sekund, najlepiej uzupełnionego wytwornicą mgły.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płaska miseczka z 1-2 cm wody, np. niska podstawka lub połówka łupiny orzecha brazylijskiego, daje żabom miejsce do picia i kąpieli, a także służy jako miejsce rozrodu, gdy samiec przenosi kijanki. Z miseczki musi być łatwo wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest dla roślin: świetlówki lub listwy LED przez około 12 godzin dziennie. Blisko spokrewnione gatunki dobrze sobie radzą bez UVB, więc jest ono opcjonalne.
ŻYWIENIE	Żaby dostają żywe, drobne owady: skoczogonki i muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a dorosłe przyjmują także większą *Drosophila hydei* i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunki z tego rodzaju są aktywne za dnia, naziemne i terytorialne, a samce nawołują ze stałych miejsc. Głos godowy *E. boulengeri* w wąskim ujęciu nie został bliżej opisany.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia i Ekwador.