herpy

DRZEWOŁAZY

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei to mały, czarny drzewołaz o długości 13-20 mm z pomarańczowymi do żółtych plamami. Żyje w lesie górskim w okolicach Mindo w północno-zachodnim Ekwadorze i jest zagrożony. Od 2024 roku uznawany jest za synonim *Epipedobates espinosai*. Wiedza o jego hodowli jest niewielka.

Rodzina: Dendrobatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**18-20 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Część wodna** głębokość 2-5 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-30**
Czas do wyklucia	**9-14 dni**
Okres larwalny	**42-70 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Epipedobates darwinwallacei* jest niewielka i gatunek ten raczej nie jest utrzymywany.
TEMPERATURA	Utrzymuj 20-24 °C w dzień i 18-20 °C w nocy. Odpowiada to chłodniejszemu końcowi zakresu odpowiedniego dla *Epipedobates tricolor* z tej samej wysokości. Zwykle wystarcza temperatura pokojowa i oświetlenie.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj kilka razy dziennie lub zastosuj instalację deszczującą, np. trzy razy dziennie po 20-60 sekund, najlepiej uzupełnioną zamgławiaczem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij małą, stałą część wodną z 2-5 cm wody i łagodnym spadkiem lub rampą, aby żaby łatwo z niej wychodziły. W naturze gatunek zawsze żyje przy wolno płynącej wodzie, a mała pompka bez silnego prądu utrzymuje wodę w ruchu.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy roślinom: świetlówki lub listwy LED przez około 12 godzin dziennie. Blisko spokrewnione gatunki dobrze radzą sobie bez UVB, więc jest ono opcjonalne.
ŻYWIENIE	Żaby dostają żywe, małe ofiary: skoczogonki i muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a dorosłe przyjmują też większe *Drosophila hydei* i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*E. darwinwallacei* jest aktywny w dzień i porusza się otwarcie wśród traw i liści. Jego głos bardzo przypomina głos brązowych *E. espinosai* z nizin. Samce w obrębie rodzaju są terytorialne i nawołują ze stałych miejsc.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador.