herpy

DRZEWOŁAZY

Espinosa Poison Frog

Epipedobates espinosai

Epipedobates espinosai to mała, aktywna w dzień żaba z rodziny drzewołazów, mierząca 13-20 mm, o grzbiecie od miedzianobrązowego do ciemnoczerwonego, w niektórych populacjach czarnym z pomarańczowymi plamami. Zamieszkuje wilgotne lasy na nizinach i u podnóża Andów w północno-zachodnim Ekwadorze. Gatunek praktycznie nie jest utrzymywany, a wiedza o jego hodowli jest bardzo skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates espinosai; Phyllobates espinosai; Epipedobates darwinwallacei*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-30**
Czas do wyklucia	**9-14 dni**
Okres larwalny	**42-70 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Brak danych (DD)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Epipedobates espinosai* wiadomo niewiele, a gatunek praktycznie nie jest utrzymywany.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj 22-26 °C, z nieco chłodniejszymi i nieco cieplejszymi miejscami w terrarium, a w nocy 19-22 °C. Zwierzęta z Mindo i innych wyżej położonych stanowisk najlepiej czują się w chłodniejszym zakresie.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj kilka razy dziennie lub zastosuj system zraszający, np. trzy razy dziennie po 20-60 sekund, najlepiej uzupełniony wytwornicą mgły.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płaska miseczka z 1-2 cm wody, np. niska podstawka lub połówka łupiny orzecha brazylijskiego, daje żabom miejsce do picia i kąpieli i służy jako miejsce rozrodu, gdy samiec wypuszcza kijanki. Z miseczki musi się dać łatwo wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest dla roślin: świetlówki lub listwy LED przez około 12 godzin dziennie. Blisko spokrewnione gatunki dobrze radzą sobie bez UVB, więc jest ono opcjonalne.
ŻYWIENIE	Żaby dostają żywe, drobne owady: skoczogonki i muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a dorosłe przyjmują też większą *Drosophila hydei* i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*E. espinosai* jest aktywny w dzień i porusza się otwarcie wśród trawy i liści. Samce z tego rodzaju są terytorialne i nawołują ze stałych miejsc; populacje brązowe i pomarańczowo nakrapiane mają niemal identyczny głos.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/epipedobates-espinosai