herpy

DRZEWOŁAZY

Phantasmal poison frog

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor to mały, ciemnobrązowy drzewołaz o długości 19-23 mm z żółtymi do żółtozielonych pasami i plamami. Występuje wyłącznie na zachodnich stokach Andów w środkowym Ekwadorze i jest zagrożony. Niemal wszystkie "tricolor" w handlu to w rzeczywistości blisko spokrewniony *Epipedobates anthonyi*; prawdziwy *E. tricolor* rzadko trafia do terrariów.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates tricolor; Phyllobates tricolor*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**19-23 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-14 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-20 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**5-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-20**
Czas do wyklucia	**9-14 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**42-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Samiec i dwie samice *Epipedobates tricolor* potrzebują terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 40 cm. Grupa 5-10 zwierząt potrzebuje co najmniej 60 × 60 × 40 cm, a więcej zwierząt wymaga większej powierzchni dna.
TEMPERATURA	Utrzymuj w dzień 22-26 °C, z chłodniejszymi i cieplejszymi strefami, a w nocy pozwól temperaturze spaść do 18-20 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Gatunek znosi spadek do 50 % przez krótkie okresy, jeśli ma dostęp do wody, ale niska wilgotność bez wody może szybko okazać się śmiertelna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Przygotuj jedno lub kilka małych oczek wodnych z wodą o głębokości około 2 cm, np. podstawki, poidełka lub połówki łupin orzecha brazylijskiego, z których żaby łatwo wyjdą. Samiec może w nich zostawiać kijanki.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest dla roślin.
ŻYWIENIE	*Epipedobates tricolor* jest mały, ale żarłoczny i przyjmuje stosunkowo duże ofiary.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Samce *Epipedobates tricolor* nawołują cichym, trylującym głosem, głównie rano, a zwłaszcza po zraszaniu, najczęściej z podwyższonego stanowiska.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/epipedobates-tricolor