herpy

DRZEWOŁAZY

Rio Santiago Poison Frog

Excidobates captivus

Excidobates captivus to bardzo mały, aktywny za dnia drzewołaz o długości 12-17 mm z pogranicza Peru i Ekwadoru. Jest czarny, z pomarańczowoczerwonymi plamami ułożonymi w rzędy wzdłuż grzbietu i żółtymi plamami na kończynach i brzuchu. Żyje na dnie wilgotnego lasu deszczowego i lasu górskiego.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-17 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-8**
Okres larwalny	**65-75 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o utrzymaniu *Excidobates captivus* jest niewielka. Gatunek żyje na dnie ciepłego do umiarkowanego, stale wilgotnego lasu.

TEMPERATURA

Temperatura na stanowiskach gatunku nie była mierzona. 22-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy to wartości pomiędzy klimatem nizin a klimatem na wysokości 800-1200 m.

WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE

Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %, a podłoże musi być wilgotne przez cały rok. Zraszaj wodą z odwróconej osmozy lub deszczówką raz lub dwa razy dziennie albo zastosuj system deszczowy lub zamgławiający.

WODA I JAKOŚĆ WODY

Miska z wodą nie jest potrzebna, ponieważ żaby czerpią wilgoć ze zraszania i wilgotnej warstwy liści. Wodę w bromeliach i pojemniczkach po filmach wymieniaj co tydzień na świeżą wodę z odwróconej osmozy lub deszczówkę.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek żyje w cieniu na dnie lasu, więc oświetlenie ma przede wszystkim zapewnić wzrost roślin i 12-godzinny dzień. UVB nie jest konieczne, ale opcjonalne.

ŻYWIENIE

Excidobates captivus jest tak mały, że może zjadać tylko bardzo drobne owady karmowe: skoczogonki, nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*) i najmniejsze równonogi.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest aktywny za dnia, ale dużo czasu spędza ukryty w liściach. Samiec wydaje krótkie, piskliwe dźwięki z ukrytych miejsc.

NATURALNY ZASIĘG

Peru i Ekwador.