herpy

DRZEWOŁAZY

Marañón Poison Frog

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości około 3 cm, pochodzący z Cordillera del Cóndor w północnym Peru. Jest czarny w białe kropki, rozmnaża się w wypełnionych wodą bromeliach w starym lesie górskim i jest zagrożony w naturze.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates mysteriosus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**17-20 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Dojrzałość płciowa	**10-12 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-8**
Okres larwalny	**65-75 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Excidobates mysteriosus* jest niewielka. Zwierzęta żyją w wilgotnym lesie górskim w pobliżu bromelii i skał, z ciepłymi dniami i chłodnymi nocami.
TEMPERATURA	Temperatura na stanowiskach gatunku nie została zmierzona. 21-25 °C w dzień i 17-20 °C w nocy odpowiada klimatowi pogórza. Żaby źle znoszą upał, więc unikaj dłuższych okresów powyżej 27 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %, a podłoże przez cały rok musi być wilgotne. Zraszaj wodą z osmozy lub deszczówką raz lub dwa razy dziennie albo użyj systemu deszczującego lub zamgławiającego.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Miska z wodą nie jest potrzebna, ponieważ żaby czerpią wilgoć ze zraszania i z wypełnionych wodą bromelii. Wodę w bromeliach i pojemnikach po kliszach wymieniaj co tydzień na świeżą wodę z osmozy lub deszczówkę.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i żyje w cieniu pod gęstym listowiem, więc światło ma przede wszystkim zapewnić wzrost roślin i 12-godzinny dzień. UVB nie jest konieczne, ale opcjonalne.
ŻYWIENIE	*Excidobates mysteriosus* jest na tyle duży, że przyjmuje nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), skoczogonki, a u dorosłych osobników także *Drosophila hydei*. W naturze gatunek żywi się mrówkami i małymi muchami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień, a samiec odzywa się głośno i często z roślin i skał w terrarium.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.