herpy

DRZEWOŁAZY

Trinidad Poison Frog

Mannophryne trinitatis

Mannophryne trinitatis to mała, brązowa i aktywna za dnia żaba o długości 25-28 mm, występująca wyłącznie na Trynidadzie, gdzie żyje przy czystych, kamienistych strumieniach w wilgotnym lesie. Samiec podczas nawoływania może stać się czarny jak węgiel, a samica ma wyraźnie żółte gardło. Gatunek praktycznie nie jest utrzymywany, a wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Aromobatidae Dawna nazwa: *Phyllobates trinitatis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-28 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**23-27 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Część wodna** głębokość 3-5 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**6-13**
Czas do wyklucia	**21 dni**
Okres larwalny	**40-50 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Mannophryne trinitatis* jest skąpa.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 23-27 °C, a w nocy 20-22 °C. Żaby z leśnych strumieni źle znoszą upał, więc utrzymuj temperaturę poniżej 28 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Zraszaj codziennie, tak aby liście i kamienie były mokre. Zamgławiacz ułatwia utrzymanie stabilnej wilgotności. Zadbaj o wentylację, żeby powietrze nie stało w miejscu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek potrzebuje stałej części wodnej z płytką, czystą i najlepiej lekko płynącą wodą o głębokości 3-5 cm, z kamieniami i liśćmi. Mała pompka może wytworzyć lekki nurt, a żaby muszą móc łatwo wyjść na ląd.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB raczej nie jest konieczne, ale niska dawka (strefa Fergusona 1) jest opcjonalna. Oświetlenie dla roślin przez 10-12 godzin utrzyma przy życiu mech i paprocie.
ŻYWIENIE	Gatunek potrzebuje drobnych stawonogów: małych i dużych muszek owocowych (*Drosophila melanogaster* i *Drosophila hydei*), skoczogonków i małych równonogów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Mannophryne trinitatis* jest aktywna za dnia i terytorialna. Samice bronią swoich miejsc częściej niż samce, groźbami, zapasami i pościgiem, a jako groźbę eksponują żółte gardło.
NATURALNY ZASIĘG	Trynidad i Tobago.