herpy

DRZEWOŁAZY

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea to mały drzewołaz o długości 20-22 mm, który żyje wysoko w koronach drzew wilgotnego lasu górskiego w zachodniej Panamie. Jest czarny lub brązowy z okrągłymi żółtymi plamkami, rozmnaża się w bromeliach 10-16 m nad ziemią, a kijanki żywią się wyłącznie jajami składanymi przez samicę. Gatunek jest krytycznie zagrożony.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates arboreus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-22 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 80 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**15-19 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-8**
Czas do wyklucia	**14 dni**
Okres larwalny	**40-50 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Krytycznie zagrożony (CR)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Oophaga arborea* jest niemal żadna, a gatunek jest prawie nieznany w niewoli.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 20-24 °C, a w nocy spadać o co najmniej 4-5 °C, do około 15-19 °C. Odpowiada to klimatowi lasu mglistego ze średnią roczną temperaturą około 19 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień i wzrastać do 100 % w nocy.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Miska z wodą nie jest potrzebna. Żaby czerpią wilgoć z mgły, deszczu i wypełnionych wodą bromelii, które służą także kijankom.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje wysoko w koronach drzew, gdzie światło jest silniejsze niż na dnie lasu, ale mgła je przytłumia.
ŻYWIENIE	Dorosłe osobniki dostają małe, nielotne muszki owocowe, skoczogonki, świeżo wyklute mikroświerszcze i planktonu łąkowego; te same owady karmowe stosuje się dla pozostałych gatunków z rodzaju.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Oophaga arborea* to dzienna żaba nadrzewna, rzadko widywana na ziemi.
NATURALNY ZASIĘG	Panama.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-arborea