herpy

DRZEWOŁAZY

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 19-22 mm, pochodzący z pacyficznej strony Kostaryki i skrajnie zachodniej Panamy. Skóra jest wyraźnie ziarnista, grzbiet czerwony, pomarańczowy lub oliwkowozielony, a kończyny i brzuch niebieskozielone do turkusowych. Gatunek żyje wzdłuż zacienionych leśnych strumieni, a samica karmi swoje kijanki niezapłodnionymi jajami.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates granuliferus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**19-22 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**6 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**17-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**12-18 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-5**
Czas do wyklucia	**19-20 dni**
Okres larwalny	**87-212 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Oophaga granulifera* jest skąpa, a gatunek jest rzadki w hobby.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 21-25 °C, a żaby są najbardziej aktywne przy 20-22 °C. W nocy temperatura powinna spaść o 4-5 °C, do około 17-21 °C. Wahania sezonowe są minimalne, około 1-2 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-90 %, a 100 % wczesnym rankiem i pod koniec dnia, gdy terrarium jest zraszane.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płytkie naczynie z wodą o głębokości 1-2 cm, np. niska miska wkopana w podłoże lub część wodna między kamieniami, zapewnia wodę do picia i wilgotność powietrza. Żaby słabo pływają, dlatego woda musi być na tyle płytka, aby mogły stanąć na dnie.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje w zacienionym dnie lasu, dlatego oświetlenie ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby roślin.
ŻYWIENIE	Dorosłe zwierzęta dostają małe, nielotne muszki owocowe, skoczogonki, świeżo wyklute mikroświerszcze, najmniejsze larwy barciaka i plankton łąkowy.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Oophaga granulifera* jest płochliwa i prowadzi bardzo skryty tryb życia, zwłaszcza w porze suchej, kiedy niemal całkowicie się ukrywa.
NATURALNY ZASIĘG	Kostaryka i Panama.