herpy

DRZEWOŁAZY

Harlequin Poison Frog

Oophaga histrionica

Oophaga histrionica to dzienny drzewołaz o długości 3-4 cm z lasów deszczowych zachodniej Kolumbii, brązowy do czarnego z dużymi pomarańczowymi plamami. Kijanki żywią się wyłącznie niezapłodnionymi jajami, które składa dla nich samica, przez co gatunek należy do najtrudniejszych w rozmnażaniu drzewołazów. Jest krytycznie zagrożony, a jego zakres taksonomiczny zmieniono w 2018 roku.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates histrionicus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**9 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**12 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-20**
Czas do wyklucia	**10 dni**
Okres larwalny	**90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Krytycznie zagrożony (CR)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para potrzebuje terrarium typu las deszczowy o wymiarach co najmniej 50 × 50 × 50 cm, a większe jest lepsze. Gatunki z rodzaju *Oophaga* bywają terytorialne, więc trzymaj tylko jedną parę, chyba że terrarium jest bardzo duże.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 24-26 °C, a w nocy obniża się ją o 5-6 stopni, do 18-21 °C. W ciągu roku temperatura musi się wahać tylko o 1-2 stopnie i nie ma okresu zimowania.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w środku dnia i dochodzić do 100 % rano i wieczorem. Najłatwiej osiągnąć to za pomocą systemu zraszającego i zamgławiacza sterowanych timerem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dla dorosłych wystarczy płaska miska z około 1 cm wody i rampą z kamieni lub mchu. Używaj wody z odwróconej osmozy, deszczówki lub odchlorowanej wody z kranu i często ją wymieniaj.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim bromeliom i innym roślinom. Zapewnij około 12 godzin światła dziennie z LED lub świetlówek, które mało grzeją.
ŻYWIENIE	*Oophaga histrionica* zjada drobne stawonogi, w naturze głównie mrówki, termity, roztocza i małe chrząszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Oophaga histrionica* jest aktywny w dzień. Samiec nawołuje z nisko położonego stanowiska, a samce bronią swoich terytoriów. Dlatego trzymaj w terrarium tylko jedną parę. Nie bierz żab do ręki.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-histrionica