herpy

DRZEWOŁAZY

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni to rzadki, aktywny w dzień drzewołaz z niewielkiego obszaru w zachodniej Kolumbii, czarny lub ciemnobrązowy z szerokimi czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi pasami. W naturze jest krytycznie zagrożony, a do terrarium nadają się wyłącznie osobniki z hodowli. Gatunek wymaga doświadczonego hodowcy: nie znosi ciepła, a kijanki żywią się wyłącznie niezapłodnionymi jajami samicy.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates lehmanni*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**4-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-24 °C**
Temperatura w nocy	**17-19 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Liczba jaj w zniesieniu	**3-10**
Czas do wyklucia	**14-28 dni**
Okres larwalny	**60-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Krytycznie zagrożony (CR)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *O. lehmanni* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze, zwłaszcza do rozmnażania.
TEMPERATURA	*O. lehmanni* pochodzi z chłodnego górskiego lasu deszczowego i jest bardziej wrażliwy na ciepło niż większość drzewołazów.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %: wysoka rano i wieczorem, najlepiej z mgłą, tak by sięgała 100 %, i nieco niższa w środku dnia, do około 70 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Żaby nie potrzebują miski z wodą, ponieważ wilgotność pokrywa ich potrzeby.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaba jest aktywna w dzień i żyje w cieniu pod koronami drzew. Nie ma dowodów, że gatunek potrzebuje UVB, gdy pokarm jest posypywany witaminą D3, ale słabe oświetlenie UVB (strefa Fergusona 1) można stosować bez szkody.
ŻYWIENIE	*O. lehmanni* je wyłącznie żywe, drobne stawonogi. Podstawą pokarmu są nielotne muszki owocowe, a gatunek jest na tyle duży, że przyjmuje również większe *Drosophila hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*O. lehmanni* jest aktywny w dzień i spokojny, ale samce są terytorialne i nawołują ze stałych miejsc. Trzymaj gatunek w parach. Samce są wobec siebie bardzo agresywne i się tłamszą, a słabszy samiec może umrzeć ze stresu.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-lehmanni