herpy

DRZEWOŁAZY

drzewołaz truskawkowy

Oophaga pumilio

Oophaga pumilio to mały, dzienny drzewołaz o długości 17-24 mm z lasów deszczowych Ameryki Środkowej, znany z licznych odmian barwnych i niezwykłej opieki nad potomstwem: samica karmi każdą kijankę niezapłodnionymi jajami. Obserwowanie go jest fascynujące, ale wymaga doświadczenia, drobnego pokarmu i cierpliwości.

Rodzina: Dendrobatidae Nazwa angielska: Strawberry Poison Frog Dawna nazwa: *Dendrobates pumilio*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-24 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**19-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**3-5**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**42-56 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para lub mała grupa licząca do czterech osobników potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość). Więcej zwierząt wymaga większej powierzchni dna.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 22-26 °C, najlepiej około 24 °C, a w nocy 19-21 °C. Temperatury poniżej 18 °C lub powyżej 32 °C utrzymujące się dłużej mogą być śmiertelne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza musi być wysoka, 70-100 %. Celuj w 70-80 % w dzień i do 100 % w nocy, np. przez zraszanie cztery razy dziennie z automatycznego systemu. System zraszający z timerem jest więc dużym ułatwieniem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z wodą, ale woda może sięgać najwyżej ok. ¾ wysokości żaby, w praktyce poniżej 1 cm, bo gatunek słabo pływa i może się utopić. Użyj płaskiej miski z rampą z kamieni lub mchu i często wymieniaj wodę.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij 12 godzin światła dziennie, aby rośliny dobrze rosły. Dobrym wyborem jest lampa LED do roślin, która niewiele grzeje.
ŻYWIENIE	*Oophaga pumilio* potrzebuje bardzo drobnego pokarmu, najwyżej ok. 2 mm. Podstawą są małe, nielotne *Drosophila melanogaster* i skoczogonki, uzupełniane mszycami, termitami i innym drobnym pokarmem.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Oophaga pumilio* jest aktywna w dzień, śmiała i ciekawska, i dużo porusza się w liściach. Samce bronią terytoriów brzęczącym, przypominającym świerszcza nawoływaniem i mogą walczyć z innymi samcami.
NATURALNY ZASIĘG	Nikaragua, Kostaryka i Panama.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-pumilio