herpy

DRZEWOŁAZY

## Vicente's Poison Frog

# *Oophaga vicentei*

*Oophaga vicentei* to mały, jaskrawo ubarwiony i aktywny za dnia drzewołaz, osiągający do 24 mm, występujący wyłącznie w środkowej Panamie. Ubarwienie waha się od żółtego i czerwonego po niebieskie, szare i zielone, często z czarnym siateczkowatym wzorem. Gatunek jest zagrożony w naturze, a wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae  Dawna nazwa: *Dendrobates vicentei*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **12-24 mm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **10-15 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i naziemny** |
| Środowisko | **Las deszczowy** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **22-26 °C** |
| Temperatura w nocy | **19-21 °C** |
| Wilgotność | **80-100%** |
| Woda | **Miska z wodą**<br>głębokość 1-2 cm |
| UVB | **Opcjonalne**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **W kątach liści (np. bromelii)** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **1-12** |
| Czas do wyklucia | **10-14 dni** |
| Okres larwalny | **42-56 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Niezapłodnione jaja samicy** |
| Opieka nad potomstwem | **Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Zagrożony (EN)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Oophaga vicentei* jest skąpa. Opiera się więc na klimacie i siedlisku oraz na krewniakach lepiej poznanych w niewoli: *Oophaga pumilio*, *Oophaga histrionica*, *Oophaga sylvatica* i *Oophaga lehmanni*. |
| **TEMPERATURA** | Temperatura w dzień powinna wynosić 22-26 °C, a w nocy 19-21 °C. Żaby źle znoszą ciepło, więc unikaj dłuższych okresów powyżej 28 °C. Ustaw terrarium w chłodnym miejscu, zadbaj o wentylację i używaj lamp, które nie grzeją. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 % i nigdy nie spadać poniżej 70 %. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Wystarczy płaska miseczka z 1-2 cm wody, bo żaby słabo pływają. Utrzymuj ją w czystości i wymieniaj wodę codziennie lub co drugi dzień. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | UVB raczej nie jest konieczne, ale niewielka dawka UVB (strefa Fergusona 1) nie szkodzi i jest opcjonalna. Oświetlenie dla roślin przez 10-12 godzin dziennie utrzymuje rośliny przy życiu, a noc powinna być ciemna. |
| **ŻYWIENIE** | Gatunek potrzebuje bardzo małych owadów karmowych. Podstawą diety są małe, nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*) i skoczogonki, uzupełniane mszycami, małymi termitami i małymi równonogami. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Oophaga vicentei* jest aktywny za dnia. Samiec nawołuje z wysoko położonego miejsca i wybiera miejsce rozrodu. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Panama. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-vicentei