herpy

DRZEWOŁAZY

Kokoe Poison Frog

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia to dzienny drzewołaz o długości 3-4 cm z pacyficznego wybrzeża Kolumbii, czarny, z dwoma zielonymi do złocistych pasami wzdłuż grzbietu. Dzikie osobniki mają w skórze śmiertelną truciznę, ale zwierzęta z hodowli są nietoksyczne. Gatunek jest śmiały, głośno się nawołuje i łatwo się rozmnaża.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates aurotaenia*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Silne**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-24 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**8-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**8-28**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para lub mała grupa *Phyllobates aurotaenia* potrzebuje terrarium typu las deszczowy o wymiarach co najmniej 60 × 45 × 45 cm dla maksymalnie 4 dorosłych osobników.
TEMPERATURA	*Phyllobates aurotaenia* najlepiej czuje się w chłodniejszych warunkach. W dzień temperatura powinna wynosić 21-24 °C, a w nocy obniża się ją do 18-21 °C. Temperatura nie może przekraczać 27 °C, bo rodzaj źle znosi upał.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Gatunek krótkotrwale znosi spadek do 50 %, jeśli ma dostęp do wody, ale niska wilgotność bez wody może szybko okazać się śmiertelna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miseczka z 1-2 cm wody i kamieniem lub pochyłym brzegiem, żeby żaby mogły łatwo wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim roślinom. Świetlówki lub oświetlenie LED o barwie około 6 500 K dają naturalne kolory i dobry wzrost roślin, a typowy jest około 12-godzinny dzień świetlny. Żarówki i halogeny wytwarzają za dużo ciepła i wysuszają powietrze.
ŻYWIENIE	*Phyllobates aurotaenia* zjada drobne stawonogi. Młode przyjmują bezskrzydłe *Drosophila melanogaster*, a dorosłe chętnie jedzą większy pokarm, np. *Drosophila hydei* i bardzo małe świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Phyllobates aurotaenia* jest aktywny w dzień i śmiały, ale jako młody płochliwy.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/phyllobates-aurotaenia