herpy

DRZEWOŁAZY

Liściołaz dwubarwny

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor to żółty lub pomarańczowy drzewołaz o długości 3-5 cm z lasów deszczowych zachodniej Kolumbii, często z czarnymi lub zielonkawymi nogami. W naturze jest jednym z najbardziej toksycznych znanych zwierząt, ale osobniki z hodowli nie są toksyczne. Jest śmiały, ciekawski i prawie zawsze na widoku, a w terrarium chętnie się rozmnaża.

Rodzina: Dendrobatidae Nazwa angielska: Black-legged Poison Dart Frog

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-5 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**4,5 g**
Długość życia	**6-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Silne**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**12 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-30**
Czas do wyklucia	**13-14 dni** przy 21-23 °C
Okres larwalny	**21-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *Phyllobates bicolor* potrzebuje terrarium typu las deszczowy o wymiarach co najmniej 50 × 50 × 50 cm. Licz około 40 litrów na każde dorosłe zwierzę. Grupa do dziewięciu osobników potrzebuje co najmniej 70 × 70 × 70 cm.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 21-25 °C, a w nocy obniża się ją o 3-4 stopnie, do 18-21 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w środku dnia i dochodzić do 100 % rano i wieczorem.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Gatunek docenia powierzchnię wody w terrarium. Zapewnij jedną lub kilka małych miseczek z 1-2 cm wody, z których zwierzęta łatwo wyjdą, albo niewielką część wodną przy przedniej szybie z odpływem, by wodę dało się łatwo wymieniać.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim roślinom. Wystarczą świetlówki lub LED przez około 12 godzin dziennie.
ŻYWIENIE	*Phyllobates bicolor* preferuje małe owady karmowe o wielkości najwyżej około 3 mm.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Phyllobates bicolor* jest aktywny w dzień, bardzo ruchliwy i ciekawski, prawie zawsze na widoku. Samce nawołują głośno trylującymi, brzęczącymi tonami, czasem przez kilka dni z rzędu.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/phyllobates-bicolor