herpy

DRZEWOŁAZY

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris to mały, czarny drzewołaz o długości 19-24 mm z dwoma żółtymi, złotymi lub pomarańczowymi pasami wzdłuż grzbietu. Żyje na dnie lasu w nizinnym lesie deszczowym po karaibskiej stronie Ameryki Środkowej, od Nikaragui po Panamę. Od czasu do czasu pojawia się w handlu, ale wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Dendrobatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**19-24 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-3 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**7-21**
Okres larwalny	**45-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Phyllobates lugubris* jest skąpa.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 21-25 °C, a w nocy 18-21 °C, tak jak u *Phyllobates vittatus*.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %, a podłoże i ściółka liściowa muszą być zawsze wilgotne.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dorosłe żaby nie piją, lecz wchłaniają wodę przez skórę, i wystarczy płytka miska z 1-3 cm wody. *Phyllobates vittatus* chętnie korzysta z niewielkiej części wodnej, a w naturze kijanki są przenoszone do strumieni.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje na dnie lasu, gdzie światło jest przytłumione, a konieczność stosowania UVB nie została udokumentowana. Słaba lampa UVB w strefie Fergusona 1 jest opcjonalna; zawsze zapewnij wtedy cień.
ŻYWIENIE	*Phyllobates lugubris* w naturze zjada głównie mrówki i roztocza. W terrarium podaje się drobne stawonogi: bezskrzydłe muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), skoczogonki, małe równonogi i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i żyje ukryty wśród liści i roślin. Samce nawołują z ukrytych miejsc i bronią swojego terytorium przed innymi samcami, więc kilka samców w jednym terrarium może powodować stres.
NATURALNY ZASIĘG	Nikaragua, Kostaryka i Panama.